

$$()_n$$

I- عموميات حول المتتاليات

1- تعريف و مصطلحات

a/ أنشطة

1/ لاحظ ثم أتمم خمسة أعداد ملائمة لتسلاسل كل لائحة من اللوائح التالية:

$$\begin{aligned} & \dots, 11, 9, 7, 5, 3, 1 \quad -a \\ & \dots, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1 \quad -b \\ & \dots, -\frac{3}{32}, -\frac{3}{16}, -\frac{3}{8}, -\frac{3}{4}, -\frac{3}{2}, -3 \quad -c \\ & \dots, \frac{6}{7}, \frac{5}{6}, \frac{4}{5}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2} \quad -d \\ & \dots, 9, 5, 4, 1, 3, -2 \quad -e \end{aligned}$$

- كل لائحة من اللوائح تسمى متتالية و الأعداد المكونة لكل لائحة تسمى حدود المتتالية

- نلاحظ أن لوائح أعلاه تسير بانتظام معين
اللائحة a هي الأعداد الفردية في ترتيب تصاعدي

اللائحة b هي أعداد على شكل $\frac{1}{n}$ بتعويض n بعدد صحيح طبيعي غير منعدم

اللائحة c هي أعداد على شكل $\frac{-3}{2^n}$ بتعويض n بعدد صحيح طبيعي

اللائحة d هي أعداد على شكل $\frac{n}{n+1}$ بتعويض n بعدد صحيح طبيعي غير منعدم

اللائحة e هي أعداد حصلنا فيها على الحد الثالث بمجموع الحدين اللذين قبله و الحد الرابع
بمجموع الحدين اللذين قبله وهكذا.....

2/ في كل لائحة من اللوائح a و b و c إذا رمنا لأول عدد من اللائحة بـ u_0 و الثاني بـ u_1 و الثالث بـ u_2

و هكذا دواليك فإننا نحصل على اللائحة $u_0, u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

أ/ ما رتبة u_8 ب/ حدد قيمة

ج/ ما رتبة u_n ، حدد

- $u_0, u_1, u_2, u_3, \dots$ تسمى حدود متتالية

- اذا كان الحد الاول هو u_0 فان رتبة u_0 هي 1 و رتبة u_1 هي 2 و هكذا..... رتبة u_n هي $n+1$

$$ج- a/ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{-3}{2^n} /c \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{1}{n+1} /b \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 2n+1$$

u_n يسمى الحد العام للمتتالية

3/ في اللائحة d إذا رمنا لأول عدد من اللائحة بـ v_1 و الثاني بـ v_2 و الثالث بـ v_3

و هكذا دواليك فإننا نحصل على اللائحة v_1, v_2, v_3, \dots

ما رتبة v_n ، حدد

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad v_n = \frac{n}{n+1} \quad \text{و} \quad v_n \text{ هي } n \quad \text{رتبة } v_n$$

4/ حد صيغة التي تسير عليها اللائحة e

لاحظنا أن في اللائحة e أعداد حصلنا فيها على الحد الثالث بمجموع الحدين اللذين قبله و الحد الرابع بمجموع الحد باللذين قبلهما وهكذا.....
اذا اعتبرنا أن $w_4 = w_2 + w_3$ و $w_3 = w_1 + w_2$ حدود متتالية اللائحة e فان $w_{n+2} = w_{n+1} + w_n$

ملاحظة:

الممتاليات في a و b و c و d أعطينا حدها العام بصيغة صريحة أي لحساب أي حد نعرض n و نحصل على النتيجة ألم في e أعطينا حدها العام بدلالة حدود للممتالية أي لحساب حد يجب أن نرجع إلى حدين قبلهما

b / تعريف

ليكن n_0 عدداً صحيحاً طبيعياً و $I = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0\}$ جزء من \mathbb{N}
كل دالة من I نحو \mathbb{R} تسمى متتالية عددية

اصطلاحات

- * $I \rightarrow \mathbb{R}$: u : متتالية عددية

يرمز لصورة n بواسطة u_n عوض (u) . العدد u_n يسمى حد الممتالية ذا المدل n ويسمى أيضاً الحد العام.

يرمز للممتالية بـ $(u_n)_{n \in I}$ عوض u .

- اذا كان $I = \mathbb{N}$ فإنه يرمز للممتالية بـ $(u_n)_{n \geq 0}$ او (u_n)

- اذا كان $I = \mathbb{N}^*$ فإنه يرمز للممتالية بـ $(u_n)_{n \geq 1}$

- اذا كان $I = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0\}$ فإنه يرمز للممتالية أيضاً بـ $(u_n)_{n \geq n_0}$

أمثلة

نعتبر الممتاليات العددية (u_n) و $(v_n)_{n \geq 2}$ و $(w_n)_{n \geq 1}$ المعرفة بـ :

$$\begin{cases} w_1 = -2 \\ w_{n+1} = 2w_n + 1 \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}^* \quad \text{و} \quad v_n = 2n^2 - 3n \quad \text{و} \quad u_n = (-2)^n + 3n$$

أحسب الحدود الأربع الأولى لكل من الممتاليات (u_n) و $(v_n)_{n \geq 2}$ و $(w_n)_{n \geq 1}$

2- تحديد متتالية

تحدد الممتالية اذا علمت حدودها أو الوسيطة التي تمكّن من حساب أي حد من حدودها.
وهناك عدة طرق منها على الخصوص:

أ- الممتالية المحددة بالصيغة الصريحة للحد العام.

أمثلة

نعتبر الممتاليات العددية (u_n) و $(v_n)_{n \geq 1}$ و $(w_n)_{n \geq 1}$ المعرفة بـ :

$$w_n = \frac{(-2)^n}{n+1} \quad \text{حيث } a \text{ عدد حقيقي} \quad \text{و} \quad u_n = 2n - 6$$

(u_n) و $(v_n)_{n \geq 1}$ و $(w_n)_{n \geq 1}$ ممتاليات محددة بالصيغة الصريحة

أحسب الحد الثالث لكل من الممتاليات (u_n) و $(v_n)_{n \geq 1}$ و $(w_n)_{n \geq 1}$

ب - الممتالية الترجعية: أي لحساب حد من حدودها نرجع لحدود أخرى

أمثلة

نعتبر الممتاليات العددية (u_n) و $(v_n)_{n \geq 1}$ و $(w_n)_{n \geq 1}$ المعرفة بـ :

$$\begin{cases} w_3 = 1 \\ w_{n+1} = 3w_n - 1 \end{cases} \quad n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = 2v_n + v_{n-1} \end{cases} \quad \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_n = \frac{u_{n-1}}{1+u_{n-1}} \end{cases} \quad n \geq 1$$

$(w_n)_{n \geq 1}$ و $(v_n)_{n \geq 1}$ و (u_n) ممتاليات ترجعية

w_0 ; w_2 ; v_3 ; v_2 ; u_3 ; u_2 ; u_1 / أحسب

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{2}{2n+1}$$

II- الممتاليات المحدودة - الممتاليات الراستية

1- الممتالية المكبورة - الممتالية المصغورة - الممتالية المحدودة أنشطة

نعتبر الممتاليات العددية (u_n) و (v_n) حيث

$$u_n = \frac{n+1}{2n+3} \quad \text{و} \quad v_n = \frac{2}{3}n - 1$$

$$u_0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_n \leq \dots$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq 3$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq 3$$

لدينا $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq 3$ نقول إن الممتالية (u_n) مكبورة بالعدد 3

نقول إن الممتالية (u_n) مكبورة بالعدد 1

تعريف

تكون الممتالية $(u_n)_{n \in I}$ مكبورة اذا وفقط اذا وجد عدد حقيقي M بحيث

$\forall n \in I \quad u_n \leq M$ تكون الممتالية $(u_n)_{n \in I}$ مصغردة اذا وفقط اذا وجد عدد حقيقي m بحيث

تكون الممتالية $(u_n)_{n \in I}$ محدودة اذا وفقط اذا كانت $(u_n)_{n \in I}$ مكبورة و مصغردة

$$\exists k \in \mathbb{R}_+^* \quad \forall n \in I \quad |u_n| \leq k \Leftrightarrow (u_n)_{n \in I} \text{ محدودة}$$

تمرين

نعتبر الممتاليات العددية (u_n) و (v_n) و (w_n) المعرفة بـ :

$$w_n = \frac{(-1)^n}{n+1} \quad \text{و} \quad \begin{cases} v_1 = 2 \\ v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n + 2 \end{cases} \quad \text{و} \quad u_n = 2n - 1$$

بين أن (u_n) مصغردة و (v_n) مكبورة بالعدد 3 و (w_n) محدودة.

2- الممتالية الراستية

تعريف

تكون الممتالية $(u_n)_{n \in I}$ تزايدية اذا وفقط اذا كان لكل n و m من I : $n > m \Rightarrow u_n > u_m$

تكون الممتالية $(u_n)_{n \in I}$ تزايدية قطعا اذا وفقط اذا كان لكل n و m من I : $n > m \Rightarrow u_n > u_m$

تكون الممتالية $(u_n)_{n \in I}$ تناقصية اذا وفقط اذا كان لكل n و m من I : $n > m \Rightarrow u_n < u_m$

تكون الممتالية $(u_n)_{n \in I}$ تناقصية قطعا اذا وفقط اذا كان لكل n و m من I : $n > m \Rightarrow u_n < u_m$

تكون الممتالية $(u_n)_{n \in I}$ تابثة اذا وفقط اذا كان لكل n و m من I لدينا

أمثلة

ادرس رتبة الممتاليتين العدديتين (u_n) و (v_n) حيث $v_n = -3n + 5$ و $u_n = 2n - 1$

$$\forall n \in I \quad u_{n+1} \geq u_n \Leftrightarrow (u_n)_{n \in I} \text{ متالية تزايدية}$$

خصائص

لتكن $I = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0\}$ ممتالية حيث

$$\forall n \in I \quad u_{n+1} \geq u_n \Leftrightarrow (u_n)_{n \in I} \text{ متالية تزايدية}$$

$$\begin{aligned} \forall n \in I \quad u_{n+1} > u_n &\Leftrightarrow \left(u_n \right)_{n \in I} \text{ متالية تزايدية قطعا} \\ \forall n \in I \quad u_{n+1} \leq u_n &\Leftrightarrow \left(u_n \right)_{n \in I} \text{ متالية تناقصية} \\ \forall n \in I \quad u_{n+1} < u_n &\Leftrightarrow \left(u_n \right)_{n \in I} \text{ متالية تناقصية قطعا} \\ \forall n \in I \quad u_{n+1} = u_n &\Leftrightarrow \left(u_n \right)_{n \in I} \text{ متالية ثابتة} \end{aligned}$$

تمرين

نعتبر المتاليات العددية $(u_n)_{n \geq 1}$ و $(v_n)_{n \geq 1}$ و $(w_n)_{n \geq 1}$ المعرفة بـ :

$$\begin{cases} w_1 = 1 \\ w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + 1 \end{cases} \quad \text{و} \quad v_n = \frac{2^n}{n} \quad \text{و} \quad u_n = \frac{n}{n+1}$$

- أدرس رتبة $(v_n)_{n \geq 1}$ و $(u_n)_{n \geq 1}$
- أ- بين أن $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $w_n < 2$
- ب- بين أن $(w_n)_{n \geq 1}$ تزايدية .

III- المتالية الحسابية - المتالية الهندسية

A- المتالية الحسابية

1- تعريف

تكون متالية $(u_n)_{n \geq n_0}$ حسابية اذا كان يوجد عدد حقيقي r بحيث $u_{n+1} = u_n + r$ حيث r يسمى أساس المتالية .

أمثلة

نعتبر المتاليتين $(u_n)_{n \geq 1}$ و $(v_n)_{n \geq 1}$ حيث $v_n = \frac{1}{n}$ و $u_n = -2n + 1$.
بين أن $(u_n)_{n \geq 1}$ حسابية محددا أساسها .

هل $(v_n)_{n \geq 1}$ حسابية؟

2- صيغة الحد العام - مجموع حدود متتابعة لمتالية حسابية

نشاط

$(u_n)_{n \geq p}$ حسابية أساسها r و حدتها الأول u_p

1/ بين بالترجع أن $u_n = u_p + (n-p)r$

2/ نضع $S_n = u_p + u_{p+1} + \dots + u_{n-1}$

أ- بين بالترجع أن $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

ب- ما عدد حدود المجموع

ت- بين أن $S_n = \frac{(n-p)(u_p + u_{n-1})}{2}$

خاصية

اذا كان $(u_n)_{n \geq p}$ متالية حسابية أساسها r فان $(u_n)_{n \geq p} = u_p + (n-p)r$

ملاحظة - اذا كان $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متالية حسابية أساسها r فان $u_n = u_0 + nr$

- اذا كان $(u_n)_{n \geq 1}$ متالية حسابية أساسها r فان $u_n = u_1 + (n-1)r$

- اذا كان $(u_n)_{n \geq p}$ متالية حسابية أساسها r فان $u_n = u_q + (n-q)r$

خاصية

لتكن $(u_n)_{n \geq n_0}$ متتالية حسابية

اذا كان $S_n = \frac{(n-p)(u_p + u_{n-1})}{2}$ فان $S_n = u_p + u_{p+1} + \dots + u_{n-1}$
 اذا كان $n-p$ هو عدد حدود المجموع S_n و u_p هو الحد الأول للمجموع S_n و u_{n-1} هو الحد الأخير
 للمجموع S_n

ملاحظة

- اذا كان $(u_n)_{n \geq n_0}$ متتالية حسابية فان S_n مجموع n حداً أولاً منها هو

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = \frac{n(u_0 + u_{n-1})}{2}$$

- اذا كان $(u_n)_{n \geq 1}$ متتالية حسابية فان S_n مجموع n حداً أولاً منها هو

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$$

تمرين

لتكن (u_n) متتالية حسابية اساسها 3 و حدتها الأول -2

1 / أحسب u_n بدلالة n وأحسب u_{200}

2 / أحسب مجموع 100 حداً أولاً للممتالية

تمرين

لتكن (u_n) متتالية حسابية حيث $u_{50} = 20$ و $u_{30} = -40$

1 / حدد أساس ثم الحد العام للممتالية (u_n)

2 / أحسب المجموع $S = u_{15} + u_{16} + \dots + u_{54}$

تمرين

أحسب $S_n = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n+1)$

تمرين

نعتبر المتتاليتين المعرفتين بـ

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = u_{n+1} - u_n \quad \begin{cases} u_0 = 1 & ; \quad u_1 = 3 \\ u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n & \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1- بين أن (v_n) متتالية ثابتة .

2- استنتج أن (u_n) متتالية حسابية و حدد عناصرها المميزة .

3- أحسب u_n بدلالة n . ثم أحسب $S_n = \sum_{i=1}^{i=n} u_i$ بدلالة n .

B- المتتالية الهندسية

1- تعريف

تكون متتالية $(u_n)_{n \geq n_0}$ هندسية اذا كان يوجد عدد حقيقي q بحيث $u_{n+1} = qu_n$ بحيث العدد q يسمى أساس المتتالية .

أمثلة

$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 3(2)^n$ متتالية حيث

بين أن (u_n) متتالية هندسية محدداً أساسها

تمرين

نعتبر المتتاليتين العدديتين $(v_n)_{n \geq 1}$ و $(u_n)_{n \geq 1}$ المعرفة بـ $v_1 = 1$ و $u_1 = 1$ و $v_n = u_n - 2$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ وبين أن $(v_n)_{n \geq 1}$ متتالية هندسية محدداً أساسها

2- صيغة الحد العام - مجموع حدود متتابعة لمتالية هندسية

نشاط

$(u_n)_{n \geq n_0}$ (متالية هندسية أساسها q)

1/ بين بالترجع أن $u_n = u_{n_0} q^{n-n_0}$

2/ تعتبر $S_n = u_p + u_{p+1} + \dots + u_{n-1}$ و $q \neq 1$

أ- بين أن $S_n - qS_n = u_p - u_n$

$$S_n = u_p \left(\frac{1-q^{n-p}}{1-q} \right)$$

خاصية

إذا كان $(u_n)_{n \geq n_0}$ (متالية هندسية أساسها q) فان $\forall n \geq n_0 \quad u_n = u_{n_0} q^{n-n_0}$

ملاحظة - إذا كان (u_n) (متالية هندسية أساسها q) فان $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = u_0 q^n$

- إذا كان $(u_n)_{n \geq 1}$ (متالية هندسية أساسها q) فان $\forall n \geq 1 \quad u_n = u_1 q^{n-1}$

- إذا كان $(u_n)_{n \geq n_0}$ (متالية هندسية أساسها q) فان $\forall n \geq p \geq n_0 \quad u_n = u_p q^{n-p}$

أمثلة

* لتكن (u_n) (متالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$) و حدتها الأول 5

حدد الحد العام للمتالية (u_n) بدلالة n

* لتكن (v_n) (متالية هندسية أساسها 3) وأحد حدودها 2

حدد الحد العام للمتالية (v_n) بدلالة n

خاصية

لتكن $(u_n)_{n \geq n_0}$ (متالية هندسية أساسها q) يخالف 1

إذا كان $S_n = u_p \left(\frac{1-q^{n-p}}{1-q} \right)$ فان $S_n = u_p + u_{p+1} + \dots + u_{n-1}$

S_n هو عدد حدود المجموع S_n و u_p هو الحد الأول للمجموع $n-p$

ملاحظة

- إذا كان (u_n) (متالية هندسية أساسها q) يخالف 1 فان S_n مجموع n حدا أولا منها هو

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = u_0 \left(\frac{1-q^n}{1-q} \right)$$

- إذا كان $(u_n)_{n \geq 1}$ (متالية هندسية أساسها q) يخالف 1 فان S_n مجموع n حدا أولا منها هو

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_1 \left(\frac{1-q^n}{1-q} \right)$$

حالة خاصة

إذا كانت $(u_n)_{n \geq n_0}$ (متالية هندسية أساسها 1) فان $S_n = u_p + u_{p+1} + \dots + u_{n-1} = u_p(n-p)$

تمرين

1/ لتكن (u_n) (متالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$) و حدتها الأول 5

حدد الحد العام للمتالية (u_n) بدلالة n

2/ لتكن (v_n) (متالية هندسية أساسها 3) وأحد حدودها 2

حدد الحد العام للمتتالية (v_n) بدلالة n

تمرين

أحسب بدلالة n المجموع $S = 2 + 4 + 8 + 16 + \dots + 2^n$

تمرين

نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ لكل $n \in \mathbb{N}$ حيث: $u_0 = -3$ و $u_1 = 4$

نضع $v_n = u_n + 6$

1. بين أن (v_n) متتالية هندسية وحدد أساسها q وحدها الأول v_0

2. احسب v_n ثم u_n بدلالة n

3. نضع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ لكل n من \mathbb{N}

احسب S_n بدلالة n