

النفران 1

المستوى منسوب للمعلم المتعمد الممنظم (O, \bar{i}, \bar{j}) .

لتكن الدالتين f و g العدديتين بحيث : $g(x) = x^2 - 4x + 3$ و $f(x) = \sqrt{4 - x}$


1. حدد D_f مجموعة تعريف الدالة f

2. اعط جدول تغيرات الدالة g .

3. أتحقق من أن $D_{g \circ f} = [-\infty; 4]$.

ب. احسب $D_{g \circ f}$ و لكل x من

4. ليكن C_f منحنى الدالة f كالتالي :



0.5

من خلال الشكل اعط جدول تغيرات الدالة f

5. حدد مبيانيا $f([-\infty; 0])$ و $f([0; 4])$.

1

6. أ. بين أن $f \circ g$ تزايدية على $[0; 4]$ و تناقصية على $[-\infty; 0]$.

1

ب. اعط جدول تغيرات الدالة $g \circ f$.

0.5

ج. استنتج أن $\sqrt{4 - x} \geq 4\sqrt{x - 8}$ لكل x من $[-\infty; 4]$.

0.5

النفران 2

المستوى منسوب للمعلم المتعمد الممنظم المباشر (O, \bar{i}, \bar{j})

نعتبر النقطتين $A\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; $B(1, 0)$

1. أحسب : \overline{OA} و \overline{OB} و $\angle AOB$

1.5

2. أحسب $\sin(\angle AOB)$ و $\cos(\angle AOB)$

1.5

ب. استنتاج القياس الرئيسي للزاوية $(\widehat{OB}, \widehat{OA})$

0.5

3. أ. بين أن معادلة ديكارتية لارتفاع المثلث OAB و المار من النقطة O هي $3x - \sqrt{3}y = 0$

1

4. ب. أ. بين أن معادلة ديكارتية للمستقيم (AB) هي $x + \sqrt{3}y - 1 = 0$

1

ج. استنتاج زوج إحداثي النقطة H المسقط العمودي للنقطة O على (AB)

0.5

يتبع

www.9alami.infos

التنقط

النمرین

المستوى منسوب للمعلم (O, \vec{i}, \vec{j}) .

لتكن النقطة D مرجع النظمة $\{(A,1); (C,1); (B,-1)\}$.

1. تحقق من أن $ABCD$ متوازي أضلاع.

2. لتكن G مرجع النظمة $\{(A,1); (C,1); (B,-1); (I,-3)\}$ حيث I مركز المتوازي الأضلاع

$ABCD$

أ. بين أن $I; G; D$ مستقيمية.

ب. بين أن G منتصف $[IB]$.

2

1.5

1

1.5

2

3. حدد مجموعة النقط M من المستوى بحيث $2 \left\| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MI} \right\| = 1$

4. نضع $A(1;2); B(2;3); C(-5;4)$.

مستعملًا خاصية زوج إحداثيي المرجح حدد زوج إحداثيي النقطة D