

التوالد الجنسي عند النباتات اللازهرية

تمهيد: النباتات اللازهرية هي نباتات لا تتوفر على أزهار، أي أن جهازها التوالدي يحمل على أعضاء خاصة، تأخذ أسماء مختلفة حسب نوع هذه النباتات، ويضم هذا النوع من النباتات عدة مجموعات منها:

- الطحالب = les algues
- السرخسيات = les fougères
- الحزازيات = les mousses

و يتميز كل نوع بخصائص انباتية وتوالدية تميزه عن باقي الأنواع، وتساعده على التأقلم مع ظروف الوسط الذي يحتله.

فما هي المميزات الانباتية والتوالدية عند النباتات اللازهرية ؟ وكيف يتم التوالد الجنسي عندها؟

I - التوالد الجنسي عند الطحالب.

① الخصائص النباتية عند الطحالب. أنظر الوثيقة 1.

الوثيقة 1: بعض أنواع الطحالب.

الطحالب عبارة عن نباتات بدائية تتميز ببنية مبسطة وبتنوع هائل، فهناك طحالب أحادية الخلية أو متعددة الخلايا، هذه الأخيرة قد تكون على شكل خيطي كطحلب الأسبيروجير (Spirogyre) أو على شكل طحالب كبيرة مشرية مثل طحلب الفوقس الحويصلي (Fucus vésiculaire). تحتوي جميع الطحالب على اليخضور، وقد يكون مقنعا بصبغة سمرء (طحالب سمرء)، أو حمراء (طحالب حمراء)... وتستطيع الطحالب العيش في جل الأوساط الرطبة: مياه عذبة أو مالحة، جدران، جذوع الأشجار ...



Chlorella vulgaris var. vulgaris

الكلوريلا
طحلب أخضر مجهري



الأسيتابولاريا
طحلب أخضر وحيد الخلية



الأسبيروجير
طحلب خيطي



الفوقس
طحلب بحري

تصنف الطحالب حسب ألوانها فنجد:


- طحالب خضراء كطحلب الأسبيروجير Spirogyre.
- طحالب سمرء كطحلب الفوقس الحويصلي Fucus vésiculaire.
- طحالب حمراء كطحلب الجيليديوم Gelidium.

كما تصنيف حسب توفرها على أحد جهازي التوالد أو على كليهما فنجد:

- طحالب متشابهة المشرة، حيث جهازي التوالد الذكري والأنثوي محمولان على نفس المشرة (مشرة ثنائية الجنس).
- طحالب مختلفة المشرة، أي أن جهازي التوالد الذكري والأنثوي محمولان على مشرتين مختلفتين (مشرة أحادية الجنس).

② التوالد الجنسي عند الفوقس الحويصلي.

أ – الجهاز الانباتي للفوقس الحويصلي. أنظر الوثيقة 2.





الوثيقة 2: الجهاز الانباتي عند الفوقس .

الفوقس الحويصلي طحلب أسمر، يعيش مثبتاً على صخور الشواطئ الأطلسية بواسطة أظفورات **Crampons**. خلال فترة نموه تظهر في نهاياته كريات أسفنجية محبة تسمى حافظات جنسية **Conceptacles**، تكون مفتوحة على الوسط الخارجي، بواسطة ثقب. تمثل هذه الحوافظ الجنسية، الجهازين التوالديين. يكون لون الحافظات الأنثوية أسمر يميل إلى الاخضرار، أما الحافظات الذكرية فتكون برتقالية اللون. الشكل أ: صورة لفوقس حويصلي أسمر. الشكل ب: رسم تفسيري للفوقس الحويصلي.

يتميز الفوقس الحويصلي بجهاز إنباتي بسيط يسمى مشرة = **Thalle**، حيث لا يمتلك جذور ولا ساق ولا أوراق، يبدي نهايات متفرعة مملوءة بغاز تسمى الطافيات، وكريات أسفنجية محبة تسمى أوراما منتجة.

ب – تعضي بنيات التوالد عند الفوقس الحويصلي.

a – الأعضاء التوالدية الذكرية: أنظر الوثيقة 3.




تتكون الحافظات الجنسية الذكرية من زغب منبري مفرع يحمل أكياسا صغيرة بيضوية الشكل تدعى منبريات (= كيس مشيجي ذكرى) **Anthéridies**، تضم بداخلها الخلايا الأم للحيوانات المنوية.

b – الأعضاء التوالدية الأنثوية: أنظر الوثيقة 4.

الوثيقة 4: الأعضاء التناسلية الأنثوية عند الفوقس الحويصلي .


يعطي الشكل أ: مقطع عرضي في ورم تناسلي أنثوي. الشكل ب: مقطع في حافظة جنسية أنثوية. الشكل ج: رسوم تخطيطية تفسيرية للأعضاء التوالدية الأنثوية.



تتكون الحافظات الجنسية الأنثوية من زغب عقيم غير مفرع، يحمل أكياسا بيضوية الشكل تدعى النميات Oogones ، تحتوي على الخلايا الأم للأمشاج الأنثوية.


ج - تشكل الأمشاج عند الفوقس الحويصلي.

a - تشكل الأمشاج الذكرية: أنظر الوثيقة 5.




تتعرض الخلية الأم (2n) داخل المنبرية لانقسام اختزالي لتعطي أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية (n)، تتضاعف هذه الأخيرة عن طريق أربعة انقسامات غير مباشرة، لتعطي 64 حيوان منوي (حيي منبري)، كل حيوان منوي مزود بسوطين. تحرر مع سائل برتقالي في ماء البحر عبر فتحة الحافظة الجنسية.

b – تشكل الأمشاج الأنثوية: أنظر الوثيقة 6.




تتعرض الخلية الأم ($2n$) داخل النمية لانقسام اختزالي لتعطي أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية (n). تتضاعف هذه الأخيرة بانقسام غير مباشر فتعطي 8 خلايا تكبر وتتطور لتعطي 8 بويضات غير ملقحة أحادية الصيغة الصبغية لا تمتلك سوطا. تحرر عبر فتحة الحافظة الجنسية في ماء البحر

د - الإخصاب ومصير البويضة. أنظر الوثيقة 7.




يتم تحرير الأمشاج في ماء البحر، فتترسب البويضات غير الملقحة. أما الحيوانات المنوية، فتستعمل سباطها، لتتجه نحو البويضات بفعل ظاهرة الانجذاب الكيميائي. تحيط بكل بويضة أعداد كبيرة من الحيوانات المنوية، لكن واحد فقط يتمكن من اختراق غشائها. تدخل نواة الحيوان المنوي، في حين يبقى السوطان في الخارج، ثم تقترب نواة الحيوان المنوي من نواة البويضة، فيلتحمان، وينتج عن ذلك بويضة ثنائية الصيغة الصبغية ($2n$)، تتكاثر وتنمو فتعطي إما نباتا مشيجا ذكريا أو أنثويا.

ه - دورة النمو عند الفوقس الحويصلي. أنظر الوثيقة 8.



يشكل تعاقب ظاهرتي الانقسام الاختزالي والإخصاب دورة النمو Cycle de développement. تتميز دورة النمو عند الفوقس الحويصلي بطول الطور ثنائي الصيغة الصبغية، بينما يقتصر الطور أحادي الصيغة الصبغية على الأمشاج فقط. نقول إذن أن للفوقس دورة ثنائية الصيغة الصبغية. ويمكن تمثيلها تخطيطيا على الشكل التالي:





③ التوالد الجنسي عند طحلب الأسبيروجير.

أ - الإخصاب ومصير البيضة. أنظر الوثيقة 9.


الوثيقة 9: التوالد عند طحلب الأسبيروجير.

الشكل أ: خييطات الأسبيروجير
الشكل ب: ظاهرة الاقتران عند طحلب الأسبيروجير.
الشكل ج: تكون بيضة ثنائية الصيغة الصبغية.
الشكل د: من الإخصاب إلى تكون البيضة عند الأسبيروجير
اعتمادا على معطيات هذه الوثيقة بين خاصيات التوالد لدى طحلب الأسبيروجير.




الأسبيروجير طحلب أخضر يعيش في المياه العذبة، وهو عبارة عن خييط مكون من عدة خلايا أحادية الصيغة الصبغية (n) مرتبطة فيما بينها. يتكاثر طحلب الأسبيروجير عادة عن طريق انقسامات غير مباشرة، مما يؤدي إلى استطالة خييطاته (توالد لا جنسي) وعندما تصبح الظروف المناخية غير ملائمة لهذا النوع من التكاثر، يعتمد طريقة ثانية، يمكن اعتبارها نوعاً من التوالد الجنسي لهذا النوع من الطحالب، حيث يحدث نوع من التزاوج بين خييطين متقابلين، وتظهر بين خلاياها المتقابلة أنابيب تدعى قناطر الاقتران Pons de conjugaison والتي تسمح بمرور نواة أحد الخييطين (والذي يمكن اعتباره خييطاً ذكورياً) نحو نواة الخييط المقابل (والذي يمكن اعتباره خييطاً أنثوياً). تتحد النواتان وتتشكل بيضة ثنائية الصيغة الصبغية ($2n$). تتعرض البيضة مباشرة بعد الإخصاب للانقسام الاختزالي مكونة أربعة أبواغ (n)، ثلاثة من بينها تتلاشى ويدخل البوغ المتبقي في حياة بطيئة. وعندما تصبح الظروف ملائمة، ينبت البوغ ويعطي خييط أسبيروجير جديد أحادي الصيغة الصبغية (n).

ب - دورة النمو عند الأسبيروجير. أنظر الوثيقة 10.



تتميز دورة النمو عند الأسبيروجير بطول الطور الأحادي الصيغة الصبغية، بينما يقتصر الطور ثنائي الصيغة الصبغية على البيضة فقط. نقول إذن أن للأسبيروجير دورة أحادية الصيغة الصبغية. ويمكن تمثيلها تخطيطياً على الشكل التالي:



II – التوالد الجنسي عند الحزازيات. Les Bryophytes

① الخصائص النباتية عند الحزازيات. أنظر الوثيقة 11.

الوثيقة 11: الخصائص النباتية وأعضاء التوالد عند الحزازيات.


تنمو الحزازيات Bryophytes في الأوساط الرطبة، وتشكل غطاء أخضر اللون خلال فترات الرطوبة، أو رماديا خلال فترات القحولة. ويتكون هذا الغطاء من نبيتات يخضورية تحمل خييطات Soie تعلوها جفينة Capsule مغطاة بكمة Coiffe. وتوجد داخل الجفينة أكياس بوعية Sporangium يحدث بداخلها الانقسام الاختزالي لتتشكل الأبواغ Spores. عند سقوطها على التربة، تنمو الأبواغ لتشكل خيوطا متفرعة تدعى النميص Protonéma. ينمو هذا الأخير، وتتكون في نهايته مثيريات Anthéridies، حيث تتكون الأمشاج الذكرية، و/أو حاملات البويضات Archégones التي توجد بوسطها ببوضة غير ملقحة. يقع الإخصاب داخل حامله الببوضة، فتتشكل ببوضة تنمو وتتطور لتعطي نباتا بوعيا جديدا Sporophyte.



نبات مشيجي أنثوي + نبات بوعي



نبات مشيجي ذكري



الحزازيات نباتات لا زهرية صغيرة القد، لها ساق و أوراق ولكن ليس لها جذور (وبر أو زغب جذري Rhizoïde). تعيش في الأماكن الرطبة، حيث يمكن أن نجدها في التربة وعلى الجدران والسقوف وعلى جذوع الأشجار، كما أن بعضها يعيش في المستنقعات بل وحتى في المياه الجارية.

يتبين من معطيات الوثيقة أن الحزازيات خلال دورة حياتها تظهر على شكلين:

- نبات مشيجي Gamétophyte يتكون جهازه الانباتي من وبر جذري وساق وأوراق صغيرة وفي نهايته توجد أعضاء التوالد (ذكرية أو أنثوية).
- نبات بوغي Sporophyte يعيش متطفلا على النبات المشيجي الأنثوي ويحمل كيسا بوغيا يحرر أثناء النضج أباغا تتشكل نتيجة الانقسام الاختزالي.

② جهاز التوالد عند الحزازيات. أنظر الوثيقة 11.


أ – جهاز التوالد الذكري.

يوجد جهاز التوالد الذكري على شكل وعاء في قمة النبات المشيجي الذكري. يحتوي على عدة أكياس تسمى المئبريات، يتم على مستواها إنتاج حيوانات منوية ثنائية السوط (= حبيبات مئبرية).

ب – جهاز التوالد الأنثوي.

يوجد جهاز التوالد الأنثوي في قمة النبات المشيجي الأنثوي، ويتكون من قنابات طويلة تضم بداخلها حاملة الببيضة غير الملقحة.

③ تشكل أعضاء التوالد والأمشاج عند الحزازيات. أنظر الوثيقة 12.




تتشكل كل من المئبرية وحاملة الأمشاج الأنثوية انطلاقا من إحدى خلايا العضو الذكري أو الأنثوي، تسمى خلية أصلية، وهي أحادية الصيغة الصبغية. بعد التكاثر والنمو والتفرق يتم الحصول على مئبرية تحتوي على حبيبات مئبرية (n)، وعلى حاملة أمشاج تحتوي على ببيضة غير ملقحة (n).

④ الإخصاب ومصير الببيضة. أنظر الوثيقة 13.

الوثيقة 13: من الأبواغ إلى النباتات.

تشكل قنابات أنثوية
وأخرى ذكورية جديدة




عندما تتوفر الظروف الملائمة خصوصا توفر الماء، تحرر المثبريات حبيبات مثبرية تسبح بواسطة سياتها حتى تصل إلى حاملة الأمشاج وتخترق عنقها ثم إلى البيضة غير الملقحة حيث يتم الإخصاب فنحصل على بيضة ($2n$).


تتعرض البيضة بعد الإخصاب لانقسامات غير مباشرة متتالية وتنمو لتعطي جنينا يعيش متطفلا على النبات المشيجي الأنثوي. يتحول الجنين إلى نبات بوعي يحمل في نهايته كيسا بوعيا. توجد داخل الكيس البوعي الخلايا الأم للأبواغ، التي تتعرض للانقسام الاختزالي مشكلة عددا كبيرا من الأبواغ الأحادية الصيغة الصبغية. عند نضج الكيس البوعي ينحني، وتسقط السديدة، فتتحرر الأبواغ الناضجة.

عند توفر الظروف الملائمة، تنبت الأبواغ، وتعطي خيوطا سرعان ما تتفرع، مكونة نميصات Protonémas. بعض الفروع تتحول إلى براعم، والبعض الآخر يتحول إلى جذيرات تثبت في التربة، وينتج عن إنبات الأبواغ نباتات مشيجية، تنتشر على شكل بساط في الأماكن الرطبة.

⑤ دورة النمو عند الحزازيات. أنظر الوثيقة 14.



تتميز دورة النمو عند الحزازيات بوجود جيل أحادي الصيغة الصبغية، المتمثل في النبات المشيجي الذكري والأنثوي، وجيل ثنائي الصيغة الصبغية، المتمثل في النبات البوغي. نقول إذن أن دورة نمو الحزازيات هي دورة أحادية ثنائية الصيغة الصبغية. ويمكن تمثيلها تخطيطيا على الشكل التالي:



III - التوالد الجنسي عند السرخسيات. Les fougères

① الخصائص النباتية عند السرخسيات. أنظر الوثيقة 15.

الوثيقة 15: الجهاز الانباتي لسرخس الخنشار.

السرخسيات نباتات يخضورية وعائية تنتشر في الكثير من مناطق العالم، باستثناء المناطق الجافة. تتكون من جهاز نباتي جد متفرق يتضمن جذورا وساقا وأوراق. على الوجه السفلي للأوراق الناضجة تظهر في فصل الربيع تكدسات من الأكياس البوغية، تلعب دورا أساسيا في تكاثر السرخس.

① = جهاز إنباتي لسرخس الخنشار.
 ② = الوجه السفلي لورقة سرخس الخنشار.
 ③ = ملاحظة مجهرية لكيس بوغي منفتح.

مثال سرخس الخنشار = *Polypodium vulgare*

ينمو سرخس الخنشار في الأماكن الرطبة والمظللة، تحت الأشجار أو الصخور وعلى الجدران القديمة والحافات. ويتكون جهازه النباتي من جذومور Rhizome تنبثق منه أوراق مفصصة ومجموعة من الجذور العرضية التي تثبته بالتربة.

يتواجد سرخس الخنشار على شكلين:


- الشكل المورق الذي ينتج الأبواغ، يسمى النبات البوغي.
- الشكل الذي ينتج الأمشاج، يسمى المشيرة أو النبات المشيجي.

② تعضي أعضاء التوالد عند السرخسيات.

أ - النبات البوغي وتشكل الأبواغ. أنظر الوثيقة 15.

يتشكل النبات البوغي من خلايا ثنائية الصيغة الصبغية ($2n$). في فصل الربيع، تظهر على الوجه السفلي لأوراق النبات البوغي كتل منتفخة صفراء (صرر) تحتوي على أكياس بوغية. تتضمن الأكياس البوغية عدة خلايا أم للأبواغ ثنائية الصيغة الصبغية. عند النضج تتعرض كل خلية أم لانقسام اختزالي مكونة أربعة أبواغ أحادية الصيغة الصبغية.

ب - النبات المشيجي وتشكل الأمشاج. أنظر الوثيقة 16، شكل ①، ②، ③، و ④.



تنتشر الأبواغ بواسطة الرياح، وعند سقوطها على التربة، ويتواجد الظروف الملائمة، تنبت لتعطي وريقة خضراء ذاتية التغذية تدعى المشيرة Prothalle، لها شكل قلب وقطر بين 6 و 12mm. وتمثل النبات المشيجي.


تتكون المشيرة من خلايا أحادية الصيغة الصبغية. في الجهة السفلى من المشيرة تنمو جذيرات تثبتها بالتربة وتمكنها من الحصول على الماء والأملاح المعدنية. تتكون في الجهة السفلى من المشيرة الأعضاء التوالدية الذكرية (المئبريات)، والأعضاء التوالدية الأنثوية (حاملات الأمشاج).

بعد نضجها، تحرر المئبريات عدة حبيات مئبرية أحادية الصيغة الصبغية ومتحركة بواسطة عدة اسواط. عند نضجها، تحمل حامل الأمشاج ببيضة غير ملقحة أحادية الصيغة الصبغية وكبيرة الحجم وغير متحركة.

③ من الإخصاب إلى نمو البويضة. أنظر الوثيقة 16، شكل 5.

عند نضج الحيوانات المنوية والبويضات غير الملقحة، تكون طبقة من الماء على سطح المشيرة كافية لتمزيق غشاء المثبرية وانفتاح عنق حامله البويضة غير الملقحة. تسبح الحيوانات المنوية في هذه الطبقة من الماء بفضل قدرتها على الحركة، وتتجه نحو البويضة غير الملقحة. يتمكن حيوان منوي واحد من تخصيب البويضة، فتتكون البويضة ($2n$)، التي تبدأ في الانقسام مباشرة بعد الإخصاب. ينتج عن هذه الانقسامات تشكل جنين سرخس، ينمو في البداية متطفلا على المشيرة ثم يصير تدريجيا نبتة فتية خضراء مستقلة بذاتها تنمو لتعطي نباتا بوعيا.

④ دورة النمو عند السرخسيات. أنظر الوثيقة 17.



تتميز دورة النمو عند السرخسيات بوجود جيل ثنائي الصيغة الصبغية ($2n$)، المتمثل في النبات البوعي، والذي ينتج أبواغا أحادية الصيغة الصبغية (n). وجيل أحادي الصيغة الصبغية، المتمثل في النبات المشيجي، والذي ينتج أمشاجا أحادية الصيغة الصبغية. نقول إذن أن دورة نمو السرخسيات هي دورة أحادية ثنائية الصيغة الصبغية. ويمكن تمثيلها تخطيطيا على الشكل التالي:

