

التمرين 1:

حدد مجموعة تعريف الدالة f في كل من الحالات التالية:

$$f(x) = \frac{x+3}{x^2 - 2x - 15}$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2|x-1|}$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - x - 2}{x^2 + 3x + 2}}$$

$$f(x) = \tan x + \sin x$$

$$f(x) = \frac{2 \cos x + \sqrt{3}}{2 \cos x - \sqrt{3}}$$

$$f(x) = \sqrt{\cos x - \sin x}$$

$$f(x) = \sqrt{\tan x - \sqrt{3}}$$

التمرين 2:

أدرس زوجية الدالة f في كل من الحالات التالية:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{|x+1| + |x-1|}$$

$$f(x) = \frac{x-3}{x^2 - 2x - 3}$$

$$f(x) = \tan x + \sin x$$

$$f(x) = \frac{2 \cos x + \sqrt{3}}{2 \cos x - \sqrt{3}}$$

$$f(x) = \frac{\sin x}{2 \cos x - 1}$$

التمرين 3:

أدرس دورية الدالة f و حدد دورها في كل من الحالات التالية:

$$f(x) = \sqrt{x+18}$$

$$f(x) = \tan x + \sin x$$

$$f(x) = |\sin x|$$

$$f(x) = \cos(3x) + \sin(2x)$$

$$f(x) = \frac{2 \cos x + \sqrt{3}}{2 \cos x - \sqrt{3}}$$

$$f(x) = \frac{\sin x}{2 \cos x - 1}$$

التمرين 4:

نعتبر f دالة عدديّة معرفة في R و دورية ، دورها 2

بحيث: $(\forall x \in [0,1]) : f(x) = 2x - 1$

1. أحسب $f(2k)$ و $f(2k+1)$ لكل عدد صحيح نسيبي k .

2. صوغ $f(x)$ بحسب المجال:

$$x \in [-1,0] .2.1$$

$$x \in [1,2] .2.2$$

$$x \in [-2,-1] .2.3$$

3. مثل منحنى f في المستوى المنسوب لمعلم متعمد منظم.
4. بين أن:

$$(\forall x \in R \setminus \{2k+1/k \in \mathbb{Z}\}) : f(x) = 2(|x| - E(|x|))(-1)^{E(|x|)} - 1$$

(ذكير: $E(x)$ هو الجزء الصحيح للعدد x)

التمرين 5:

نعتبر f دالة عدديّة فردية معرفة في R و دورية ، دورها 3

بحيث: $(\forall x \in \left[0; \frac{3}{2}\right]) : f(x) = x(x-3)$

1. أحسب $f(3k)$ و $f(3k + \frac{3}{2})$ لكل عدد صحيح نسيبي k .

2. صوغ $f(x)$ بحسب المجال:

$$x \in \left[-\frac{3}{2}; 0\right] .2.1$$

$$x \in \left[\frac{3}{2}; 3\right] .2.2$$

$$x \in \left[-3; -\frac{3}{2}\right] .2.3$$

3. مثل منحنى f في المستوى المنسوب لمعلم متعمد منظم.

التمرين 6:

نعتبر دالة عدديّة f معرفة على D_f و دالة عدديّة g معرفة على D_g بحسب:

$D_f \neq \emptyset$ و $D_g \subset R$ و $D_g \subset D_f$
 $(\forall x \in D_g) : -x \in D_g$ و $(\forall x \in D_f) : -x \in D_f$

1. نضع لكل x من D_f :

$$i(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x)) \text{ و } p(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$$

1.1. حدد زوجية الدالتين i و p .

1.2. استنتج أن f هي مجموع دالة زوجية و أخرى فردية.

2. نفترض أن $D_f \cap D_g \neq \emptyset$.

2.1. نعتبر عددين حقيقيين α و β . حدد زوجية الدالة

عماً $\alpha.f + \beta.g$ لهم نفس الزوجية.

2.2. أدرس زوجية الدالتين fg و $\frac{f}{g}$ بحسب زوجية f و g

و g .

3. نفترض أن $f(D_f) \cap D_g \neq \emptyset$. حدد زوجية gof في كل من الحالات التالية:

3.1 زوجية f

3.2 و g فرديتان

3.3 فردية و g زوجية.

4. بين أن $\frac{1}{3}$ هي القيمة الدنيا المطلقة للدالة f .
5. ناقش و حل المعادلة $f(x) = m$ في R حيث m باراميتر من R .

التمرين 12:

نعتبر f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بـ:

$$f(x) = x^3 - 3x^2$$

1. هل f زوجية؟ فردية؟
2. صغر $(x-2)f$ بدالة $f(x)$.
3. بين أن 0 هي قيمة قصوى نسبية للدالة f .
4. استنتج أن -4 هي قيمة دنيا نسبية للدالة f .
5. هل f مكبورة؟ مصغرفة؟
6. أدرس رتابة الدالة f على المجالات التالية:

$$[-\infty; 0] \cup [0; 2] \cup [2; +\infty]$$
7. استنتج جدول تغير الدالة f .
8. ما هي المطارات الأخرى للدالة f ؟

التمرين 13:

- نعتبر f دالة عددية معرفة على مجال I نحو مجال J .
 نفترض أن f دالة رتيبة قطعاً على I وأن $f(I) = J$.
1. بين أن f تطبق تقابلي من المجال I نحو المجال J .
 2. بين أنه إذا كان $J \in I$ فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل واحداً في المجال I .
 3. استنتاج أنه إذا كان a و b من I بحيث $a < b$ فان المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل واحداً في المجال I .
 4. بين أن المعادلة $x^3 + x - 1 = 0$ تقبل حل واحداً في المجال $[0; 1]$.

التمرين 14:

لتكن f و g الدالتين المعرفتين بـ:

$$g(x) = \sqrt{x-2} \quad f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 2x)$$

ول يكن (C_f) و (C_g) المنحنيين الممثلين على التوالي للدالتين f و g في معلم متعدد منظم $(O; i, j)$.

1. تحقق من أن (C_f) و (C_g) يتقاطعان في $B(3; 0)$ و $A(2; 0)$.

2. أنشئ المنحنيين (C_f) و (C_g) .

3. حدد مبيانيا $g([2; 3])$ و $g([3; +\infty))$.

4. نعتبر الدالة العددية $h = fog$.

ادرس تغيرات الدالة h على مجموعة تعريفها D_h .

التمرين 7:

حل في R المعادلات التالية:

$$E(5x) = -8 \quad E(3x-1) = 11$$

$$E\left(\frac{1}{x}\right) = 10 \quad 2E\left(\frac{x}{2}\right) = -1$$

$$E(-x) = -E(x) \quad 2E(x) + 1 = |3E(x) - 1|$$

$$E(2x) = 2x \quad E(x) = 3x - 2$$

التمرين 8:

بين ما إذا كانت الدالة f مكبورة أو مصغرفة أو محدودة على مجموعة تعريفها:

$$f(x) = 2x^2 + x + 3 \quad f(x) = |2x+1| + x$$

$$f(x) = \cos^2 x + 3 \sin x \quad f(x) = \cos x + \sin x$$

$$f(x) = \sqrt{4x-x^2} \quad f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$$

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1} \quad f(x) = x + \sqrt{1-x^2}$$

التمرين 9:

أدرس إشارة الدالة f على مجموعة تعريفها:

$$f(x) = -2x^2 + 4x + 5 \quad f(x) = |2x-1| - |3x-1|$$

$$f(x) = 2 \sin^2 x + \sin x \quad f(x) = \cos x + \sin x$$

$$f(x) = \frac{1-\sin x}{1-\cos x} \quad f(x) = \frac{2x-1}{2x+1}$$

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 - 1} \quad f(x) = -x + \sqrt{1-x^2}$$

التمرين 10:

قارن الدالتين f و g على مجموعة تعريفهما:

$$g(x) = \sqrt{x^2 + 2x} \quad f(x) = x + 1$$

$$g(x) = 2x^2 - x + 5 \quad f(x) = x^2 - 5x + 1$$

$$g(x) = x - 2 \quad f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$$

$$g(x) = \frac{1 + \cos x}{1 + \sin x} \quad f(x) = \frac{1 - \sin x}{1 - \cos x}$$

التمرين 11:

نعتبر f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بـ:

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$$

1. حدد مجموعة تعريف f .

2. هل f زوجية؟ فردية؟

3. بين أن 3 هي القيمة القصوى المطلقة للدالة f .